UPUTSTVO ZA PACIJENTA

PantoNor
40 mg
prašak za rastvor za injekciju
pantoprazol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego što počnete koristiti ovaj lijek, jer sadrži važne informacije.
• Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga morati ponovno čitati.
• Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
• Ovaj lijek je propisan isključivo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako imaju iste znakove bolesti kao i Vi.
• Ako se jave bilo kakvi neželjeni efekti, razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom. To uključuje sve moguće neželjene efekte koji nisu navedeni u ovom uputstvu. Pogledajte odjeljak 4.

U ovom uputstvu ćete pročitati:

1. Šta je lijek PantoNor i za šta se koristi
2. Prije nego počnete koristiti lijek PantoNor
3. Kako koristiti lijek PantoNor
4. Mogući neželjeni efekti
5. Kako čuvati lijek PantoNor
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK PANTONOR I ZA ŠTA SE KORISTI

Lijek PantoNor sadrži aktivnu supstancu pantoprazol. Ona pripada grupi lijekova koji se nazivaju inhibitori protonske pumpe (IPP), koji djeluju tako što smanjuju stvaranje kiseline koja se luči u želucu. Koristi se za liječenje bolesti želuca i crijeva izazvanih povećanim lučenjem želudačne kiseline.

Ovaj lijek se ubrizgava u venu i primjenjuje se samo ukoliko ljekar smatra da su trenutno za Vas injekcije pantoprazola pogodnije od tableta pantoprazola.
Injekcije će biti zamijenjene tabletama čim Vaš ljekar procijeni da je to pogodno za Vas.

Lijek PantoNor se kod odraslih koristi za liječenje:

- refluksnog ezofagitisa - zapaljenje jednjaka (organ cjevaste strukture koji povezuje grlo i želudac) praćeno vraćanjem kiselog sadržaja iz želuca u usta;
- čira na želucu i dvanaestopalačnom crijevu;
- *Zollinger-Ellison*-ovog sindroma i drugih stanja pri kojima se u želucu stvara previše želudačne kiseline.

2. PRIJE NEGO POČNETE KORISTITI LIJEK PANTONOR

Lijek PantoNor ne smijete koristiti:
- ako ste alergični (preosjetljivi) na pantoprazol ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog lijeka (navedene u odjeljku 6);
- ukoliko ste preosjetljivi (alergični) na druge lijekove iz grupe inhibitora protonske pumpe.

Odobreno
ALMBIH
5.11.2025.

Upozorenja i mjere opreza:
Razgovarajte sa svojim ljekarom, farmaceutom prije nego što primite lijek PantoNor:

- ako imate teške probleme sa jetrom, ili ste ranije imali oboljenja jetre, jer će Vas u tom slučaju ljekar češće upućivati na laboratorijske analize krvi kojima će se utvrđivati vrijednosti enzima jetre (što ukazuje na stanje ovog organa); ukoliko dođe do povećanja vrijednosti enzima jetre u krvi, Vaš ljekar će najvjerovatnije obustaviti terapiju ovim lijekom;
- ako uzimate lijekove koji se koriste u terapiji HIV infekcije (lijekovi iz grupe inhibitora HIV proteaze – npr. atazanavir) u isto vrijeme kada primate pantoprazol, jer će ljekar možda morati da prilagodi doze ovih lijekova;
- ako ste na dugoročnoj terapiji lijekom iz grupe inhibitora protonske pumpe (IPP-uključujući pantoprazol), posebno ako ona traje duže od godinu dana, jer tada može doći do blagog povećanja rizika od preloma kuka, ručnog zgloba ili kičme; ako bolujete od osteoporoze (smanjena gustina kostiju) ili uzimate kortikosteroide (koji utiču na gustinu kostiju i mogu povećati rizik od pojave osteoporoze);
- ako primate ovaj lijek duže od 3 mjeseca, jer tada može doći do smanjenja koncentracije magnezijuma u krvi. Ovo se može manifestovati kao umor, nevoljni grčevi mišića, dezorijentacija, grčevi (konvulzije), vrtoglavica, ubrzan srčani rad. Ukoliko dođe do pojave bilo kog od ovih simptoma, recite to svom ljekaru što prije. Smanjena koncentracija magnezijuma takođe može dovesti do smanjenja koncentracije kalijuma i kalcijuma u krvi. Ljekar će Vas možda uputiti na redovne analize krvi u cilju praćenja koncentracije magnezijuma;
- ako ste ikada imali reakcije na koži nakon primjene lijekova sličnih pantoprazolu;
- ako pri liječenju pantoprazolom dobijete osip po koži (posebno na dijelovima tijela koji su izloženi suncu), a naročito ako je ovo stanje praćeno pojavom bola u zglobovima; obratite se Vašem ljekaru što prije jer će možda biti neophodno da se obustavi primjena ovog lijeka;
- prijavljene su ozbiljne kožne reakcije uključujući Stevens-Johnsonov sindrom, toksičnu epidermalnu nekrolizu, reakcija na lijek sa eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS) i multiformni eritem, povezane sa liječenjem pantoprazolom.
  Prestanite da koristite pantoprazol i odmah se obratite ljekaru ako primjetite bilo koji od simptoma koji se odnose na ove ozbiljne kožne reakcije opisane u odjeljku 4.
- ako je potrebno da uskoro radite specifičnu analizu krvi u cilju utvrđivanja vrijednosti hromogranina A.

Razgovarajte odmah sa svojim ljekarom, prije ili nakon uzimanja ovog lijeka, ukoliko primijetite bilo koji od sljedećih simptoma, jer oni mogu ukazivati na drugo mnogo ozbiljnije oboljenje:

- neplaniran gubitak tjelesne mase;
- povraćanje, posebno ako se ponavlja;
- povraćanje krvi (može izgledati kao talog kafe u povraćenom sadržaju);
- krv u stolici (stolica može biti crne ili boje katrana);
- otežano gutanje ili bol pri gutanju;
- bljedilo kože i osjećate se slabo i malaksalo (anemija);
- bol u grudima;
- bol u želucu;
- težak i/ili uporan proliv (dijareja), jer je ovaj lijek povezan sa blagim porastom broja bakterijskih infekcija gastrointestinalnog trakta.

Vaš ljekar će odlučiti da li je potrebno da uradite dodatne analize kako bi se isključilo prisustvo malignog oboljenja jer primjena pantoprazola može maskirati simptome karcinoma i odložiti postavljanje dijagnoze. Ukoliko uprkos terapiji Vaši simptomi i dalje postoje, ljekar će razmotriti sprovođenje dodatnih ispitivanja.

Djeca i adolescenti
Ovaj lijek se ne smije primjenjivati kod djece uzrasta do 18 godina, zbog toga što nije dokazano da djeluje u ovoj populacionoj grupi.

Odobreno
ALMBIH
5.11.2025.

Primjena drugih lijekova sa lijekom PantoNor

Obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lijekove, uključujući lijekove koji se mogu dobiti bez ljekarskog recepta.

Lijek PantoNor može uticati na dejstvo nekih drugih lijekova, zbog čega je potrebno da Vašeg ljekara obavijestite ukoliko uzimate:

- lijekove kao što su ketokonazol, itrakonazol i posakonazol (koji se koriste u liječenju gljivičnih infekcija) ili erlotinib (koristi se u liječenju određenih vrsta karcinoma (raka)) jer lijek PantoNor može umanjiti dejstvo ovih lijekova;
- varfarin i fenprokumon (lijekovi koji sprječavaju pojavu krvnih ugrušaka) jer će Vas ljekar možda uputiti na dodatne analize krvi;
- lijekove koji se koriste u terapiji HIV infekcije, kao što je atazanavir;
- metotreksat (lijek koji se koristi za liječenje reumatoidnog artritisa, psorijaze i nekih vrsta karcinoma) – ukoliko ste na terapiji ovim lijekom, Vaš ljekar će možda privremeno obustaviti liječenje lijekom PantoNor, jer pantoprazol može dovesti do povećanja vrijednosti metotreksata u krvi;
- fluvoksamin (koji se koristi u terapiji depresije i drugih psihijatrijskih poremećaja) – ukoliko uzimate ovaj lijek Vaš ljekar će možda prilagoditi dozu pantoprazola;
- rifampicin (koji se koristi u terapiji bakterijskih infekcija);
- preparate na bazi kantariona (*Hypericum perforatum*) (koji se koriste za liječenje blažih oblika depresije).

Razgovarajte sa svojim ljekarom prije nego što uzmete pantoprazol ako treba da uradite specifičan test urina (za THC, tetrahidrokanabinol).

Trudnoća i dojenje
Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem ljekaru za savjet prije nego što primite ovaj lijek.

Odgovarajući podaci o upotrebi pantoprazola u trudnoći nisu dostupni. Postoje podaci o izlučivanju pantoprazola u majčino mlijeko.
Ovaj lijek treba da Vam bude primijenjen samo ukoliko Vaš ljekar smatra da je korist od liječenja za Vas veća od potencijalnog rizika po Vaše nerođeno dijete ili novorođenče.

Uticaj lijeka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanje mašinama
Lijek PantoNor nema ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljama vozilima i rukovanja mašinama.

Ukoliko Vam se jave neželjene reakcije, kao što su vrtoglavica ili poremećaj vida, nemojte upravljati vozilima ni rukovati mašinama.

Lijek PantoNor sadrži natrijum
Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmoL (23 mg) natrijuma po dozi, odnosno suštinski je bez natrijuma.

3. KAKO KORISTITI LIJEK PANTONOR

Uvijek primjenjujte ovaj lijek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš ljekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni provjerite sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.
Ovaj lijek treba da primjenjuje zdravstveni stručnjak pod odgovarajućim medicinskim nadzorom. Intravenska primjena lijeka PantoNor se preporučuje samo kada oralna primjena nije moguća.

Nikada nećete biti u prilici da sami primjenjujete ovaj lijek. Vaš ljekar ili medicinska sestra će Vam primijeniti dnevnu dozu putem injekcije u venu, tokom perioda od 2 do 15 minuta.

Odobreno
ALMBIH
5.11.2025.

Rastvor spreman za upotrebu priprema se ubrizgavanjem 10 ml fiziološkog rastvora (rastvora za injekciju/infuziju natrijum-hlorida 9 mg/ml odnosno 0,9%) u bočicu sa praškom. Rastvor dobijen rekonstitucijom je bistar blago žućkast. Ovaj rastvor se može koristiti direktno ili se može primijeniti nakon razblaživanja upotrebom 100 ml fiziološkog rastvora ili 5% rastvora glukoze (55 mg/ml). Za razblaživanje treba upotrijebiti stakleni ili plastični kontejner.

Preporučena doza za odrasle je:

- *refluksni ezofagitis, čir želuca i dvanaestopalačnog crijeva*: jedna bočica (40 mg pantoprazola) na dan;
- *dugotrajno liječenje Zollinger-Ellison-ovog sindroma i drugih stanja koja se odlikuju prevelikim lučenjem želudačne kiseline*: dve bočice (80 mg pantoprazola) na dan. Vaš ljekar će u daljem toku liječenja možda prilagoditi Vašu dozu, zavisno od vrijednosti lučenja kiseline u želucu. Ukoliko Vam je propisano više od 2 bočice (80 mg) na dan, lijek će Vam biti primijenjen u dvije jednake doze. Vaš ljekar može propisati kratkotrajnu terapiju dozom većom od 4 bočice (160 mg) na dan. Ukoliko je potrebna brza kontrola lučenja želudačne kiseline, početna doza od 160 mg (4 bočice) treba da bude dovoljna za uspješno smanjenje količine želudačne kiseline.

Pacijenti sa oštećenjem funkcije jetre
Ukoliko imate teško oštećenje funkcije jetre, Vaš ljekar će propisati manju dozu lijeka - 20 mg (tj. pola bočice).

Lijek treba primijeniti intravenski tokom 2-15 minuta. Sadržaj bočice je samo za jednokratnu intravensku upotrebu. Svu neiskorišćenu količinu lijeka kao i proizvod koji je promijenio izgled (npr. ukoliko se uoči zamućenost ili pojava taloga) treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.

Primjena kod djece i adolescenata
Primjena lijeka PantoNor se ne preporučuje kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Ako ste primili više lijeka PantoNor nego što treba
S obzirom da će Vam ovaj lijek davati zdravstveni radnik u bolnici, malo je vjerovatno da ćete dobiti veću dozu lijeka od one koja je propisana. Nisu poznati simptomi predoziranja kod ljudi.
Ako imate dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se svom ljekaru, farmaceutu.

4. MOGUĆI NEŽELJENI EFEKTI

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može da prouzrokuje neželjene efekte, iako oni ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lijek.

Ukoliko Vam se javi bilo koji od narednih neželjenih efekata, odmah se obratite Vašem ljekaru:

- **Ozbiljne alergijske reakcije** (**učestalost-rijetka,** neželjeni efekti mogu da se javе kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lijek): oticanje jezika i/ili grla, poteškoće sa gutanjem, koprivnjača, otežano disanje, alergijski otok lica (*Quincke* edem/angioedem), jaka vrtoglavica praćena ubrzanim srčanim radom i obilnim znojenjem;
- **Ozbiljni kožni poremećaji** (**nepoznata učestalost,** ne može se procijeniti na osnovu dostupnih podataka): pojava plikova na koži uz naglo pogoršanje opšteg zdravstvenog stanja, erozija (ranica), uključujući blago krvarenje, očiju, nosa, usta/usana ili genitalija ili osjetljivost kože/osip, posebno na dijelovima kože izloženim svjetlosti/suncu. Takođe možete osjetiti bolove u zglobovima ili simptome nalik gripu, groznicu, otečene žlijezde (npr. ispod pazuha) i testovi krvi mogu pokazati promjene u broju bijelih krvnih zrnaca ili enzima jetre.
- crvenkaste neizdignute mrlje nalik na metu ili u obliku okruglih područja često sa središnjim mjehurićima na trupu, ljuštenje kože, ranice u ustima, grlu, nosu, na polnim organima i očima. Ovim ozbiljnim kožnim osipima mogu prethoditi groznica i simptomi slični gripu (Stevens Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza).

Odobreno
ALMBIH
5.11.2025.

- široko rasprostranjen osip, povišena tjelesna temperatura i uvećani limfni čvorovi (DRESS sindrom ili sindrom preosjetljivosti na lijekove).
- **drugi ozbiljni poremećaji** (**nepoznata učestalost,** ne može se procijeniti na osnovu dostupnih podataka): žuta prebojenost kože ili beonjača očiju (teško oštećenje ćelija jetre, žutica) ili povećanje tjelesne temperature, osip po koži i uvećanje bubrega ponekad praćeno bolnim mokrenjem i bolom u donjem dijelu leđa (ozbiljno zapaljenje bubrega), koje može voditi otkazivanju rada bubrega (bubrežna insuficijencija).

Ostali neželjeni efekti

Česti neželjeni efekti (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lijek): zapaljenje zida vene i zgrušavanje krvi (tromboflebitis) na mjestu primjene injekcije, benigni polipi u želucu.

Povremeni neželjeni efekti (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lijek): glavobolja, vrtoglavica, proliv, mučnina, povraćanje, nadimanje (gasovi), otežano pražnjenje crijeva, suva usta, bol i nelagodnost u trbuhu, osip po koži, generalizovani osip (egzantem, erupcije), svrab, osjećaj slabosti, iscrpljenosti ili opšte malaksalosti, poremećaji spavanja, prelom kuka, ručnog zgloba ili kičme.

Rijetki neželjeni efekti (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lijek): oštećenje ili potpuni nedostatak funkcije čula ukusa, smetnje sa vidom kao što je zamagljen vid, koprivnjača, bol u zglobovima, bolovi u mišićima, promjena tjelesne mase, porast tjelesne temperature, groznica (visoka tjelesna temperatura), oticanje nogu (periferni edem), alergijske reakcije, depresija, uvećanje dojki kod muškaraca.

Veoma rijetki neželjeni efekti (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lijek): dezorijentacija.

Nepoznata učestalost (ne može se procijeniti na osnovu dostupnih podataka): halucinacije, konfuzija (posebno kod pacijenata koji su ove simptome imali i ranije), trnjenje, mravinjanje, peckanje, osjećaj pečenja ili utrnulosti kože (parestezija)), osip uz moguću pojavu bola u zglobovima, zapaljenje debelog crijeva koje dovodi do učestalih vodenastih proliva.

Neželjeni efekti koji se mogu uočiti na osnovu laboratorijskih analiza krvi

Povremeni neželjeni efekti (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lijek): porast vrijednosti enzima jetre.

Rijetki neželjeni efekti (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lijek): povećane vrijednosti bilirubina, porast nivoa masti u krvi, drastičan pad broja jedne vrste bijelih krvnih zrnaca praćen jakom groznicom (visokom tjelesnom temperaturom).

Veoma rijetki neželjeni efekti (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lijek): smanjenje broja krvnih pločica (trombocita) što može dovesti do pojave modrica i krvarenja češće nego obično, smanjenje broja bijelih krvnih zrnaca (leukocita) što može voditi češćoj pojavi infekcija, istovremeno abnormalno smanjenje broja crvenih i bijelih krvnih zrnaca kao i krvnih pločica.

Nepoznata učestalost (ne može se procijeniti na osnovu dostupnih podataka): smanjenje nivoa natrijuma, magnezijuma, kalcijuma ili kalijuma u krvi (vidjeti odjeljak 2).

Prijavljivanje sumnje na neželjene efekte lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

Odobreno
ALMBIH
5.11.2025.

5. KAKO ČUVATI LIJEK PANTONOR

Držite ovaj lijek van vidokruga i domašaja djece.

Ne smijete koristiti lijek PantoNor poslije isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon “Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog mjeseca.

Čuvati lijek na temperaturi do 30 ºC u originalnom pakovanju, radi zaštite od svjetlosti.

Nakon rekonstitucije ili rekonstitucije i razblaživanja fizička i hemijska stabilnost su dokazane u periodu od 12 sati na temperaturi do 25 °C.

Sa mikrobiološke tačke gledišta, pripremljeni rastvor treba upotrijebiti odmah. Ukoliko se ne upotrijebi odmah, uslovi i vrijeme čuvanja su odgovornost korisnika.

Ne koristite lijek PantoNor ako primijetite da se vizuelni izgled promijenio (npr. ako se uoči zamućenje ili talog).

Neupotrijebljeni lijekovi se ne smiju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Pitajte svog farmaceuta o načinu uklanjanja lijeka koji više ne koristite. Ove mjere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lijek PantoNor
Aktivna supstanca je pantoprazol-natrijum, seskvihidrat.
Jedna bočica sadrži 40 mg pantoprazola (u obliku pantoprazol-natrijum, seskvihidrata).
Pomoćna supstanca je dinatrijum-edetat i natrijum-hidroksid.

Kako lijek PantoNor izgleda i sadržaj pakovanja
Bijeli do skoro bijeli prašak poroznog izgleda.

Unutrašnje pakovanje je bočica od bezbojnog stakla hidrolitičke otpornosti tip I sa hlorobutil gumenim čepom i aluminijumskom „flip-off“ kapicom.

Intermedijerno pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 25 staklenih bočica sa praškom za rastvor za injekciju.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze dva intermedijerna pakovanja sa po 25 staklenih bočica (ukupno 50 staklenih bočica) ili složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna staklena bočica.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept i primjenjuje se samo u zdravstvenoj ustanovi prilikom pružanja zdravstvenih usluga od strane zdravstvenog radnika, a na osnovu informacija u rezimeu karakteristika lijeka kao sastavnog dijela dozvole za stavljanje lijeka u promet (ZU).

PROIZVOĐAČ (administrativno sjedište)

LABORATORIOS NORMON, S.A.
Ronda de Valdecarrizo 6, 28760 Tres Cantos, Madrid, Španija

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA (mjesto puštanja lijeka u promet)

Odobreno
ALMBIH
5.11.2025.

LABORATORIOS NORMON, S.A.
Ronda de Valdecarrizo 6, 28760 Tres Cantos, Madrid, Španija

NOSILAC ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

FARMALOGIST ALLBIX d.o.o. Bijeljina
Stefana Dečanskog 258 76300 Bijeljina, Bosna i Hercegovina

BROJ I DATUM RJEŠENJA O DOZVOLI ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

PantoNor, 40 mg, prašak za rastvor za injekciju, 1 bočica:
04-07.3-1-8869/23 od 05.11.2025.godine

PantoNor, 40 mg, prašak za rastvor za injekciju, 50 bočica:
04-07.3-1-8870/23 od 05.11.2025.godine

SLJEDEĆE INFORMACIJE SU NAMIJENJENE ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM RADNICIMA

Ovaj lijek treba da primjenjuje zdravstveni stručnjak pod odgovarajućim medicinskim nadzorom. Intravenska primjena lijeka PantoNor se preporučuje samo kada oralna primjena nije moguća. Dostupni su podaci o intravenskoj primjeni za period do 7 dana. Zbog toga, odmah čim je to moguće, parenteralnu terapiju lijekom PantoNor treba obustaviti i umjesto nje uvesti oralnu primjenu 40 mg pantoprazola.

Rastvor spreman za upotrebu priprema se ubrizgavanjem 10 ml fiziološkog rastvora (rastvora za injekciju/infuziju natrijum-hlorida 9 mg/ml odnosno 0,9%) u bočicu sa praškom. Rastvor dobijen rekonstitucijom je bistar blago žućkast. Ovaj rastvor se može koristiti direktno ili se može primijeniti nakon razblaživanja upotrebom 100 ml fiziološkog rastvora ili 5% rastvora glukoze (55 mg/ml). Za razblaživanje treba upotrijebiti stakleni ili plastični kontejner.

Nakon rekonstitucije ili rekonstitucije i razblaživanja fizička i hemijska stabilnost su dokazane u periodu od 12 sati na temperaturi do 25 °C.
Sa mikrobiološke tačke gledišta, pripremljeni rastvor treba upotrijebiti odmah. Lijek PantoNor ne treba rekonstituisati niti miješati sa drugim rastvaračima, osim gore navedenih. Lijek treba primijeniti intravenskim putem u periodu od 2 do 15 minuta.
Sadržaj bočice je za jednokratnu upotrebu.
Svu neiskorišćenu količinu lijeka kao i proizvod koji je promijenio izgled (npr. ukoliko se uoči zamućenost ili pojava taloga) treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.

Odobreno
ALMBIH
5.11.2025.